

Atenționare a Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea

2017-08-09 14:38:33



Urmare a notei de serviciu nr. 6798/03.08.2017 cu privire la confirmarea în municipiul Satu Mare la nivelul a două focare de PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ la porcii domestici, în vederea prevenirii acestei maladii, în prezentei veți acorda o atenție sporită respectării interdicției de a organiza târguri pentru vânzarea/cumpărarea

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vrancea

Urmare a notei de serviciu nr. 6798/03.08.2017 cu privire la confirmarea în municipiul Satu Mare la nivelul a două focare de PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ la porcii domestici, în vederea prevenirii acestei maladii, în prezentei veți acorda o atenție sporită respectării interdicției de a organiza târguri pentru vânzarea/cumpărarea. Mentionăm că proprietarii de suine sunt obligați să anunțe imediat pe medicul veterinar concesionar sau în caz de îmbolnăvire sau de mortalitate care apare la suine (poate fi anunțat și DSVSA Vrancea).

Va transmitem alaturat semnele clinice ale bolii:

Clinic boala poate evolua supraacut și acut; mai rar poate evolua subacut și cronic.

Moartea subită, cu puține semne clinice (în forma supraacută moartea poate să apară înainte de apariția

Febra mare: 40,5-42 grade C, care se menține 3-4 zile și sindrom hemoragipar;

Abatere, inapetenta, anorexie, pulsul accelerat și aritmic, dispnee, tuse, jetaj seros, sero-mucos sau sero-hemoragic și hemoragică;

Polidipsie, vomitari, constipație urmată de diaree (uneori hemoragică);

Pielea urechilor cianotică, uneori pot apărea hematoame;

La nivelul părții inferioare a abdomenului, extremităților membrelor și cozii, pe fondul cianotic apar pete h

Cu 24-48 ore înainte de moarte, la un număr mare de animale, apar semne de meningoencefalită: agitație, manevră, retropulsie, pareze și paralizii;

Scroafele gestante avortează;

Moartea apare în 5-13 zile, uneori 20 zile.